Тестовое залание*

Школа «Современные алгоритмы ведения пациента с артериальной гипертонией»

- 1. Какая из перечисленных групп препаратов препятствует образованию атерогенных липопротеинов:
 - а) антагонисты кальция
 - **b**) антиангинальные
 - с) b-адреноблокаторы
 - d) статины
 - е) периферические вазодилятаторы
- 1. Прогноз заболевания у больных ИБС является наиболее неблагоприятным при локализации атеросклеротических бляшек в:
 - а) правой коронарной артерии;
 - **b**) передней нисходящей коронарной артерии;
 - с) общем стволе левой коронарной артерии;
 - **d**) огибающей коронарной артерии;
 - е) артерии тупого края.
- 3. Самой частой причиной вазоренальной артериальной гипертонии является:
 - а) неспецифический аортоартериит;
 - **b**) фибромышечная дисплазия;
 - с) аневризмы почечных артерий;
 - **d**) атеросклероз почечных артерий;
 - е) тромбозы и эмболии почечных артерий.
- 4. Ожирение является фактором риска для:
 - а) сахарного диабета;
 - **b**) атеросклероза;
 - с) желчно-каменной болезни;
 - **d**) почечно-каменной болезни;
 - е) хронического гастрита.
- 5. Гиперхолестеринемия может наблюдаться при:
 - а) атеросклерозе;
 - **b**) холестазе;
 - с) сахарном диабете;
 - **d**) гипотиреозе.

^{*} Выполнение тестового задания осуществляется по желанию участника УМ